# AVERTISSEMENTS

AGRICOLES

BULLETIN **TECHNIQUE** DES **STATIONS** DLP 26-10-76005889 D'AVERTISSEMENTS To sound exeluter AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Villa Blanche - 62, Avenue Nationale - La Neuvillette, 51100 REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture à Châlons-sur-Marne

ULLETIN Nº 82 - 22 octobre 1976

Abonnement annuel: 50 F

# ARBORICULTURE FRUITIERE

### raitement d'automne des arbres fruitiers

Dans notre bulletin du 8 septembre nº 79 nous préconisions un traitement cuprique dès la fin de la récolte des arbres fruitiers à noyau. Nous appelons qu'il ne faut pas attendre la chute totale des feuilles pour exécuer celui-ci.

Sur pommiers et poiriers, l'intervention cuprique est aussi recommandée dès la chute des premières feuilles. Ce traitement assure la protection des arbres contre les maladies bactériennes (Pseudomonas syringae, en partidulier sur poire Conférence), et divers champignons, dont le plus grave est e chancre à nectria sur toutes les variétés de pommes. Cette maladie est favorisée par les automnes humides. pas sensiblement les risques mais sereit plutôt un élément défavorable en

# , elabred al ab GRANDE CULTURE letred to etnel obvel enu tragema

#### Hucerons sur escourgeons

Les pucerons observés sur escourgeons sont peu fréquents et il est maintenant probable que des populations sérieuses ne sont plus à redouter. Il y a donc pas lieu d'envisager des interventions aphicides destinées à éviter a transmission de la jaunisse nanisante de l'orge sur ces escourgeons.

campagne Rappelons que cette maladie à virus a sévi, au cours de la dernière ans plusieurs régions de France et qu'elle a causé quelques dommages en Champagne. Toutefois, il ne faut pas oublier que de nombreux autres facteurs ont du au cours de l'hiver et du printemps une incidence défavorable et passagère sur la végétation des escourgeons. La récupération remarquable de ces cultures partir de la fin avril et les excellents rendements enregistrés en constituent la preuve.

# Sécheresse et résidus d'herbicides

La rareté des précipitations enregistrées au cours de la dernière campagne culturale pose de façon sérieuse le problème des résidus d'herbicides dans le sol.

Si certaines contrées ont été relativement favorisées par la pluviosité au cours des dernières semaines, par contre, pour d'autres, les pluies enregistrées restent toujours inférieures à la normale.

P1156

AVERTISSEMENTS

Pour Reims il a été noté en septembre 24 mm contre une moyenne de 58 mm et les vingt premiers jours d'octobre n'ont apporté que 21,9 mm contre une moyenne de 30 mm.

Toujours pour cette Station, la pluviosité enregistrée pour la dernière période culturale, soit du ler octobre 1975 au 30 septembre 1976, a été de 270 mm contre une moyenne de 598 mm. Nous n'avons donc pas même bénéficié de la moitié d'une pluviosité normale.

Par avis du 23 août nous avons attiré l'attention des exploitants sur cette question en recommandant des mesures de prudence pour certains semis de colzas et pour les blés à envisager derrière maïs traités aux triazines.

En ce qui concerne ces blés derrière maïs nous estimons que ces recommandations demeurent valables. En particulier il ne devrait pas être réalisé cette année d'implantation de ces blés sur sols non labourés.

Bien que le problème soit moins aigu il est probable qu'un certain risque existe également pour les céréales à implanter derrière des cultures désherbées avec des herbicides rémanents à action racinaire.

Dans cescas il apparait souhaitable d'effectuer un bon labour avant le semis. D'autre part il est préférable, complémentairement, de s'abstenir d'utiliser certains herbicides de pré-levée (Chlortoluron, Métabenzthiazuron, Néburon, Terbutryne). En effet les reliquats d'herbicides de la culture précédente pourraient sensibiliser les céréales à ces produits.

Il est à remarquer que le décalage de la date du semis ne réduirait pas sensiblement les risques mais serait plutôt un élément défavorable en amenant une levée lente et parfois difficultueuse de la céréale.

dans plusieurs régions de France et qu'elle a causé quelques dommares en Chen-

sur la végétation des escourgeons. La récupération remarquable de ces cultures d partir de la fin avril et les excellents rendements en efistrés en consti-

Les Ingénieurs chargés des Le Chef de la Circonscription

H. de MEIRLEIRE of the entroll ob education of J. DELATTRE.

an A. GODIN ab stude us . ivès s suriv é albalam attac sup snolagges arrasques

Avertissements Agricoles, Phytosanitaire Champagne,

didentors and eccontreous

n° du papier de presse 529 AD

La rareté des précipitations enregiatrées au cours de la dernière dampagne culturale pose de façon sérieuse le problème des résidus d'herbici-

31 certaines contrées out été relativement favorisées par la pluviosité su cours des dernières semaines, par contre, pour d'autres, les pluies

enregistrées restent toujours inférieures à la normale.

tuent la preuve.

des dans le sol.